

DISCUS DENTAL®

Hasta Kullanım Kılavuzu

Relief®
ACP
ORAL CARE GEL





Tanım

Relief ACP Ağız bakım jeli kullanım alanı ısıya veya kimyasal uyarıcılara, periodontal durum, diş eti çekilmeleri veya diş beyazlatmalarından kaynaklanan Diş kökü veya sinir hassasiyetine karşı rahatlatma görevi yapar.

Kaşık Metodu* (en iyi netice elde etmek için)

1. Dişleri fırçalayın ve diş ipliği kullanarak iyice temizleyin.
2. Şırınganın şeffaf kapağını saat yönünün tersine döndürün ve çekerek çıkarın.
3. Kapak yerine karıştırma ucunu sıkıca saat yönünde döndürerek sıkın.
4. Diş plağı üzerindeki hassasiyet oluşan dişin karşılığına gelen fiş yuvalarına tek tek az miktarlarda jel boşaltın.

Diş plağı başına yaklaşık bir doz (şırınganın ¼) kullanın. Diş boyutlarına bağlı olarak daha az gerek duyulabilir.

5. Diş plağını üst ve/veya alt dişlere yerleştiriniz. Normal ağızda bekletme süresi 30 dakikadır. Diş hekiminizin tavsiyesi doğrultusunda veya dişteki hassasiyet duygusu hafifleyene kadar Relief ACP'yi günde iki defa takınız.
6. Fazla jelleri pamuk çubuk veya kuru diş fırçası yardımı ile alınız.
7. Diş plağını ağızdan çıkarınız ve soğuk su ile yıkayınız. Diş yüzeyindeki kalan jelleri su ile çalkalayarak veya fırçalayarak temizleyin.
8. Ürünün sızmasını önlemek için şırınga ağzından karıştırma ucunu çıkarıp kapağını takınız.
9. En iyi neticeler için, uygulamadan sonra 30 dakika boyunca yemek ve içecek kullanmayın.

** Tavsiye edilir: Damaklara kadar taşan diş plağı kullanılması tavsiye edilir, genellikle bu bölgelerde de hassasiyet oluşabilir.*

Fırçalama Metodu

1. Dişleri fırçalayın ve diş ipliği kullanarak iyice temizleyin
2. Şırınganın şeffaf kapağını saat yönünün tersine döndürün ve çekerek çıkarın.
3. Kapak yerine karıştırma ucunu sıkıca saat yönünde döndürerek sıkın.
4. Ekstra yumuşa diş fırçası yüzeyine kalın bir jel şeridi oluşturun. Jeli diş yüzeyine sürerek fırçalamaya başlayın, dişeti ucundan dişlere doğru indirerek fırçalayın, genellikle bu bölgelerde hassasiyet daha çok oluşur.
5. 3 Dakika boyunca ağız gargara yapmayın ve tükürmeyin. 3 dakika sonra fazla gelen jeli tükürerek çıkarın.
6. Ürünün sızmasını önlemek için şırınga ağızdan karıştırma ucunu çıkarıp kapağını takınız.
7. En iyi neticeler için, uygulamadan sonra 30 dakika boyunca yemek ve içecek kullanmayın.
8. Diş hekiminizin tavsiyesi doğrultusunda veya dişteki hassasiyet duygusu hafifleyene kadar Relief ACP'yi günde iki defa takınız.

Aktif İçerik

Potasyum Nitrat, Sodyum Flüorür

Diğer İçerikler

Su, Polksamer 338, Doğal Nane, Kalsiyum Nitrat, Sodyum Fosfat, Sodyum Sakarin.

Dikkat

Hassas dişler hastada başka daha ciddi problem olasılığının belirtisi olabilir ve hekim tarafından tedavi altına alınması gerekebilir. Hassasiyet devam ederse veya kötüleşirse diş hekiminize baş vurunuz. Bu ürünü hekim tarafından uzatılmadığı takdirde 4 haftadan fazla bir süre kullanmayınız.

Not: ACP özelliği diş minelerinin kuvvetlenmesi ve dişlerin tekrar mineralleşmesi görülmüştür.[†]

Uyarı

Bu ürünü yutmayınız. 6 yaş altı çocuklarda, hamile ve emziren bayanlarda kullanılması uygun değildir. Yanlışlıkla fırçaya sürülen miktardan daha fazlası yutulmuş ise hekim yardımına başvurun. Oda ısısında 20-25°C (68-77°F) saklayınız.

[†]Referanslar: Tung, M.S., Eichmiller,F.C. Diş mineralleştirmede kullanılan Amorfus Kalsiyum Fosfat. Compend Contin Educ Dent, Vol 25, No 9 Suppl 1, Sep 2004, pp 9-13. Journal Code 9600713, Journal Subset MEDJSD, ISSN 1548-8578. Corporate Author: American Dental Association Foundation.